Surveillance du taux sanguin de tacrolimus (Prograf MD)

chez les patients atteints d'une maladie rénale

Si vous prenez un médicament appelé tacrolimus (Prograf) pour traiter votre maladie rénale, votre équipe de soins rénaux pourrait vous demander de faire des analyses sanguines en laboratoire pour vérifier vos taux sanguins. Cette analyse de laboratoire est parfois appelée « surveillance du taux sanguin de tacrolimus (Prograf) » ou « taux de tacrolimus (Prograf) ». Cette analyse doit être effectuée 12 heures après la prise de la dernière dose de tacrolimus (Prograf).

Pourquoi est-il important de vérifier mon taux sanguin de tacrolimus (Prograf)?

- Votre équipe de soins rénaux doit vérifier votre taux sanguin pour **s'assurer que votre organisme contient la bonne quantité** de tacrolimus (Prograf) et pour **déterminer la dose qui vous est adaptée**.
- L'objectif est de **trouver la bonne dose pour traiter efficacement votre maladie** tout en réduisant le risque d'effets secondaires.

Quand dois-je faire une prise de sang et quand dois-je prendre ma prochaine dose?

- Le laboratoire devrait effectuer la prise de sang **12 heures après votre dernière dose de tacrolimus (Prograf)**. Par exemple, si vous avez pris votre dernière dose à 21 h la veille de la prise de sang, rendez-vous au laboratoire le lendemain matin pour une prise de sang vers 9 h. **Ne prenez** votre dose prévue de tacrolimus (Prograf) **qu'une fois** la prise de sang effectuée.
- Il existe plusieurs moyens de faire vos analyses sanguines à temps. Si possible, **prenez rendez-vous auprès du laboratoire, ou arrivez 15 minutes avant l'horaire requis** et dites au personnel du laboratoire que vous avez besoin d'effectuer une analyse à temps fixe.

Pour en savoir plus sur Santé Ontario et le Réseau rénal de l'Ontario, veuillez consulter le site **renalnetwork.on.ca/**

Qu'arrivera-t-il si je ne suis pas capable de faire une analyse de sang à temps?

- Si le laboratoire n'a pas pu effectuer votre prise de sang à temps, dites à votre équipe de soins rénaux que le test a été effectué plus tard ou plus tôt que nécessaire.
- Si le laboratoire est fermé 12 heures après votre dernière dose, demandez à votre équipe de soins rénaux de vous recommander le moment idéal pour effectuer votre prise de sang.

Que dois-je faire pour me préparer à cette analyse du taux de tacrolimus (Prograf)?

- Pour vous assurer que le résultat du test de tacrolimus (Prograf) est exact, **prenez toutes vos doses à temps** dans les cinq jours précédant votre prise de sang.
- Vous pouvez manger préalablement à la prise de sang. Vous pouvez faire cette analyse du taux de tacrolimus même si vous devez jeûner en raison d'autres analyses sanguines (par exemple, un test de glycémie à jeun) effectuées à partir de la même prise de sang.

Où dois-je faire une prise de sang aux fins d'analyse du taux de tacrolimus (Prograf)?

- La prise de sang peut être effectuée au laboratoire de votre hôpital ou dans un laboratoire communautaire (par exemple, LifeLabs ou Dynacare).
- Des frais d'analyse peuvent vous être demandés si vous vous rendez dans un laboratoire communautaire.
- Parlez à votre équipe de soins rénaux de ce qui vous conviendrait le mieux.

Le RRO tient à remercier son Groupe de travail sur l'accès aux médicaments de traitement de la GN, son Groupe des patients atteints de la GN et leurs familles et son Groupe de travail sur les priorités liées à la GN pour la préparation du présent document. Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il est destiné à compléter une discussion avec votre équipe de soins de santé. Veuillez communiquer avec un pharmacien ou un autre professionnel de la santé si vous avez d'autres questions au sujet de ce médicament.

Vous voulez obtenir cette information dans un format accessible?
1 877 280-8538, ATS 1 800 855-0511, info@ontariohealth.ca

ORN4255

Santé Ontario
Réseau Rénal de l'Ontario